



TARBIM

for plant health



PRODUCT CATALOGUE



BİTKİ BESLEME

Tüm canlılar gibi bitkiler de büyümeleri, gelişmeleri ve diğer canlıların ihtiyaç duyduğu ürünleri üretebilmeleri için gelişme ortamlarından (toprak ve atmosfer) bazı maddeleri almak mecburiyetindedirler. Bitkilerin gelişme ortamlarından aldıkları maddelere bitki besin maddesi adı verilir.

Bitki besin maddelerinin gelişme ortamından alınma mekanizması, bitki bünyesinde taşınması, güneş enerjisi, havanın karbondioksiti ve topraktan alınan su ile birlikte bitki bünyesinde oluşan bir seri metabolizma olayları sonucunda ürünün meydana gelmesini inceleyen bilim dalı bitki beslemedir. Önemli olan bitkilerin dengeli beslenmesi, yüksek ve kaliteli ürün vermesidir.

PLANT NUTRITION

Like all living things, plants have to take some substances from their growing environments (soil and atmosphere) in order to grow, develop and produce the products needed by other living things. The substances that plants take from their growing environment are called plant nutrients.

Plant nutrition is the branch of science that examines the mechanism of taking plant nutrients from the development environment, their transportation within the plant, solar energy, carbon dioxide in the air and the formation of the product as a result of a series of metabolic events that occur in the plant together with the water taken from the soil. The important thing is to feed the plants balanced and to give high and quality products.

HAKKIMIZDA

About Us

Tarbim olarak, tekstil, gıda ve tarım sektöründe yurt içi ve yurt dışında hizmet vermek amacıyla tamamen yerli sermaye ile 1997 yılından kurulmuştur. Tarım sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübemiz ışığında, firma amacımız bitki besleme grubunda yetiştiricilerin ihtiyacına yönelik, sürdürülebilir tarımdan daha kaliteli daha fazla ürün elde edilerek Türk ve dünya pazarına kazandırmaktır. Bu amaçla, dünya daki gelişmeleri ve değişimleri takip ederek, ürün skalamızı güncellemekteyiz. Tarbim markası ile satışa sunduğumuz yenilikçi ve etkili bitki besleme ürünlerimizle değer yaratıyor, sağlıklı ve kazançlı ürünlerin anahtarını veriyoruz. Tecrübeli global ekibimizle teknik çalışmalarımıza verdiğimiz önemi artırarak, sektörümüzün taleplerini yakından inceleyerek ve yakın gelecekte planladığımız yeni ürünlerimizle Tarbim olarak başarılarımızı artırmayı hedeflemekteyiz.

As Tarbim, it was established in 1997 with capital in order to serve the textile, food and agriculture sector in Turkey and abroad. We have years of experience in the agricultural industry, our company aim is to bring plants to the Turkish and world markets in order to obtain more quality products from sustainable agriculture for breeders. In this world, we update our current and current information, our product range. It transmits Tarbim product, provides effective and effective nutrition in the sun, and gives the key to a healthy and solution. By increasing the business for technical evaluation on a global scale, we are targeting new targets that we have carefully and closely planned for the use of our sector.



TARBİM
for plant health

HUMI-TAR	06	HUMIS-TAR	40
SEA-TAR	08	PREMIUM MAX	42
GREEN-TAR	10	FREE MIX	44
MICRO-TAR	12	FYPER	46
ZN-TAR	14	N-TAR	48
VOLUME-TAR	16	PZN-TAR %15	50
CU-TAR	18	PZN-TAR %30	52
IRON-TAR	20	IZOLEBIO	54
HERO-TAR	22		
IRON-TAR*PLUS	24		
POTAN-TAR	26		
CALCI-TAR	28		
BARI-TAR	30		
MINO-TAR	32		
AMINO-TAR	34		
S-TAR	36		
LASIX-TAR	38		

iÇİNDEKİLER

Contents



TARBİM



HUMI-TAR

△ *Garanti edilen içerik / Guaranteed content*

Organik madde / Organic matter

%25

Toplam azot / Total nitrogen

%1

**Suda çözünür potasyum oksit
/ Water soluble potassium oxide**

%2

**Toplam humik ve fulvik asit
/ Total humic and fulvic acid**

%6

pH

6-8

HUMI-TAR

1L - 5L - 20L

▲ KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

▲ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

▲ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolayısı ile doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisinin dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

▲ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



SEA-TAR

△ **Garanti edilen içerik / Guaranteed content**

Organik madde / Organic matter

%20

Toplam azot / Total nitrogen

%0,4

Giberellik asit / Gibberellic acid

50 PPM

Alginik asit / Alginic acid

%0,5

Maksimum Ec (DSM)

%35

Suda çözünür K₂O / Water soluble

%4

pH

%6-8

SEA-TAR

1L - 5L - 20L

▲ KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

▲ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

▲ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolayısı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

▲ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



GREEN-TAR +ME

△ Garanti edilen içerik / *Guaranteed content*

Organik madde / <i>Organic matter</i>	%20
Suda Çözünür P / <i>Water soluble P</i>	%20
Suda Çözünür K ₂ O / <i>Water soluble K₂O</i>	%20
Suda Çözünür B / <i>Water soluble B</i>	%0,01
Suda Çözünür Cu / <i>Water soluble Cu</i>	%0,005

Suda Çözünür Fe / <i>Water soluble Fe</i>	%0,03
Suda Çözünür Mn / <i>Water soluble Mn</i>	%0,01
Suda Çözünür Mo / <i>Water soluble Mo</i>	%0,002
Suda Çözünür Zn / <i>Water soluble Zn</i>	%0,02

GREEN-TAR

1Kg - 5Kg - 10Kg

▲ KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

▲ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

▲ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

▲ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



MICRO-TAR

△ **Garanti edilen içerik / Guaranteed content**

Suda Çözünür Zn / Water Soluble Zn

%5

Suda Çözünür Fe / Water Soluble Fe

%4

Suda Çözünür Cu / Water Soluble Cu

%0,5

Suda Çözünür B / Water Soluble B

%1

Suda Çözünür Mn / Water Soluble Mn

%5

Suda Çözünür Mo / Water Soluble Mo

%0,02

MICRO-TAR

1Kg - 5Kg - 10Kg

▲ KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

▲ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

▲ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

▲ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



ZN-TAR

 **Garanti edilen içerik / *Guaranteed content***

Suda Çözünür Zn / *Water Soluble Zn*

%5

ZN-TAR

1L - 5L - 20L

▲ KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

▲ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

▲ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

▲ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



VOLUME-TAR +ZN

△ **Garanti edilen içerik / Guaranteed content**

Toplam Azot / Total Nitrogen	%10
Suda Çözünür P / Water Soluble P	%10

Suda Çözünür K₂O / Water Soluble K₂O	%10
Suda Çözünür Zn / Water Soluble Zn	%2

VOLUME-TAR

1L - 5L - 20L

▲ KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

▲ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

▲ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

▲ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasıdır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



CU-TAR

 **Garanti edilen içerik / *Guaranteed content***

Suda Çözünür Cu / *Water Soluble Cu*

%8

▲ KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

▲ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

▲ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolayısı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisindedir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

▲ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



IRON-TAR

△ Garanti edilen içerik / *Guaranteed content*

Suda Çözünür Fe / *Water Soluble Fe*

%5,8

IRON-TAR

1Kg - 5Kg - 10Kg

▲ KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

▲ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

▲ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

▲ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



HERO-TAR

Garanti edilen içerik / Guaranteed content

Suda Çözünür N / Water Soluble N

%10

Suda Çözünür B / Water Soluble B

%0,1

Suda Çözünür P / Water Soluble P

%5

Suda Çözünür Fe / Water Soluble Fe

%3

Suda Çözünür K / Water Soluble K

%5

Suda Çözünür Mn / Water Soluble Mn

%4

Suda Çözünür Mg / Water Soluble Mg

%3,5

Suda Çözünür Zn / Water Soluble Zn

%6

HERO-TAR

1Kg - 5Kg - 10Kg

▲ KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

▲ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

▲ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

▲ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



IRON-TAR PLUS

 **Garanti edilen içerik / *Guaranteed content***

Suda Çözünür Fe / *Water Soluble Fe*

%8

IRON-TAR

1L - 5L - 20L

▲ KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

▲ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

▲ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolayısı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisinin dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

▲ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



POTAN-TAR

 **Garanti edilen içerik / Guaranteed content**

Suda Çözünür K₂O / Water Soluble K₂O

%30

▲ KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

▲ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

▲ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

▲ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



CALCI-TAR

△ **Garanti edilen içerik / Guaranteed content**

Toplam Azot / Total Nitrogen	%8
Nitrat Azot / Nitrate Nitrogen	%8
Suda Çözünür CaO / Water Soluble CaO	%12
Suda Çözünür B / Water Soluble B	%1
Suda Çözünür Mg / Water Soluble Mg	%2

▲ KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

▲ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

▲ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

▲ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasıdır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



BARI-TAR

 **Garanti edilen içerik / Guaranteed content**

Suda Çözünür B / Water Soluble B	%8
Suda Çözünür Mo / Water Soluble Mo	%1
pH	8-10

KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



MINO-TAR

△ **Garanti edilen içerik / Guaranteed content**

Suda Çözünür B / Water Soluble B

%1

Suda Çözünür Fe / Water Soluble Fe

%5

Suda Çözünür Mo / Water Soluble Mo

%00,5

Suda Çözünür Zn / Water Soluble Zn

%2

Suda Çözünür Cu / Water Soluble Cu

%0,5

Suda Çözünür Mn / Water Soluble Mn

%2

MINO-TAR

1L - 5L - 20L

▲ KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

▲ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

▲ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolayısı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

▲ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



AMINO-TAR

△ **Garanti edilen içerik / Guaranteed content**

Organik Madde / Organic Matter	%45
Serbest Aminoasit / Free Amino Acid	%12
Organik Azot / Organic Nitrogen	%4
Organik Karbon / Organic Carbon	%12
pH	4-6

AMINO-TAR

1L - 5L - 20L

▲ KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

▲ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

▲ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

▲ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



S-TAR

 **Garanti edilen içerik / Guaranteed content**

Suda Çözünür S / Water Soluble S

%80

S-TAR

5L - 10L - 20L



⚠ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

⚠ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

⚠ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



LASIX-TAR

Yayıcı - Yapıştırıcı

Spreader - Adhesive

LASIX-TAR

100g - 500g



⚠ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

⚠ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

⚠ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



HUMIS-TAR

△ Garanti edilen içerik / Guaranteed content

Toplam azot (N) / Total nitrogen

%15

Toplam humik ve fulvik asit

%13

Suda çözümlü potasyum oksit (K₂O)

%3

/ Total humic and fulvic acid

/ Water soluble potassium oxide

pH

9-11

HUMIS-TAR

1L - 5L - 20L

▲ KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

▲ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

▲ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

▲ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



PREMIUM MAX 555

△ Garanti edilen içerik / Guaranteed content

Organik madde / Organic matter	%30	Toplam çinko (Zn) / Total zinc	%2
Toplam azot (N) / Total nitrogen	%5	Toplam magnezyum (Mg) / Total magnesium	%1
Toplam fosfor (P) / Total phosphorus	%5	Toplam manganez (Mn) / Total manganese	%0,5
Toplam potasyum (K) / Total potassium	%5	Alginik asit / Alginic acid	%0,02
Toplam aminoasit / Total aminoacid	%3	pH	%3-5

PREMIUM MAX 555

1L - 5L - 20L

▲ KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

▲ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

▲ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolayısı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisinin dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

▲ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



FREE MIX

△ Garanti edilen içerik / *Guaranteed content*

Organik madde / <i>Organic matter</i>	%40
Toplam azot (N) / <i>Total nitrogen</i>	%8
Toplam aminoasit / <i>Total aminoacid</i>	%3
Toplam çinko (Zn) / <i>Total zinc</i>	%1,5
Toplam manganez (Mn) / <i>Total manganese</i>	%0,5

Toplam bor (B) / <i>Total boron</i>	%0,2
Toplam magnezyum (Mg) / <i>Total magnesium</i>	%1
Alginek asit / <i>Alginate acid</i>	%0,02
pH	3-5

KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolayısı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisinin dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



FYPER

△ **Garanti edilen içerik / Guaranteed content**

Suda çözümlü azot (N) / <i>Water soluble N</i>	%10	Suda çözümlü bor (B) / <i>Water soluble B</i>	%0,1
Suda çözümlü fosfor (P) / <i>Water soluble P</i>	%5	Suda çözümlü demir (Fe) / <i>Water soluble Fe</i>	%3
Suda çözümlü potasyum (K) / <i>Water soluble K</i>	%5	Suda çözümlü manganez (Mn) / <i>Water soluble Mn</i>	%4
Suda çözümlü magnezyum (Mg) / <i>Water soluble Mg</i>	%3,5	Suda çözümlü çinko (Zn) / <i>Water soluble Zn</i>	%6

▲ KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

▲ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

▲ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolayısı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

▲ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



N-TAR

△ Garanti edilen içerik / Guaranteed content

Toplam azot (N) / Total nitrogen	%20
Üre azotu / Urea nitrogen	%20
Suda çözümlü çinko (Zn) / Water soluble Zn	%1

▲ KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

▲ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

▲ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

▲ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



PZN-TAR

5-15-0+ME

 **Garanti edilen içerik / Guaranteed content**

Toplam azot (N) / Total nitrogen

%5

Suda çözümlü fosfor pentaoksit

%15

Üre azotu / Urea nitrogen

%5

/ Water soluble (P₂O₅)

Suda çözümlü çinko (Zn)

%5

/ Water soluble Zn

PZN-TAR

5-15-0+ME

1L - 5L - 20L

KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



PZN-TAR

5-30-0+ME

 **Garanti edilen içerik / Guaranteed content**

Toplam azot (N) / Total nitrogen

%5

Suda çözünür fosfor pentaoksit

%30

Üre azotu / Urea nitrogen

%5

/ Water soluble (P₂O₅)

Suda çözünür çinko (Zn)

%5

/ Water soluble Zn

PZN-TAR

5-30-0+ME

1L - 5L - 20L

KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolayısı ile doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisinin dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBİM



IZOLEBIO

Δ **Garanti edilen içerik / Guaranteed content**

Organik madde / Organic matter

%50-52

Serbest aminoasit

%12-14

Organik karbon / Organic carbon

%18-22

/ Free Aminoacid

Organik azot / Organic nitrogen

%7,5-9

pH

5,5-7,5

▲ KULLANIM DOZU, ZAMANI ve ŞEKLİ / DOSAGE, TIME AND FORM OF USE

ÜRÜN ÇEŞİDİ / TYPE OF PRODUCT	UYGULAMA ZAMANI / APPLICATION TIME	YAPRAKTAN UYGULAMA / FOLIAR APPLICATION	TOPRAKTAN UYGULAMA / SOIL APPLICATION
Sera bitkileri / Greenhouse plants	Vejetasyon süresinde 3-4 günde bir / Every 3-4 days during vegetation period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Meyve ağaçları / Fruit trees	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Bağ / Bond	Sürgünlerin kol atmaya başlamasından itibaren gelişim dönemi boyunca 10 - 15 gün ara ile / From the beginning of the shoots every 10 to 15 days during the developmental period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Zeytin / Olive	Gelişim dönemi boyunca 15 günde bir / Every 15 days during the development period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Açık alan sebze / Open field vegetables	Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir / Every 3 to 4 days during vegetation	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Şeker pancarı, Patates, Havuç, Ayçiçeği ve Pamuk / Sugar beet, Potato, Carrot, Sunflower and Cotton	Bitkiler 4-5 yapraklı iken başlayarak, gelişim dönemi boyunca 10-15 gün ara ile / Beginning when plants have 4-5 leaves, development every 10-15 days during the period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Baklagiller / Legumes	İlk çapadan itibaren 3 uygulama / 3 applications from the first anchor	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da
Hububat / Cereals	Kardeşlenme döneminde / During the fellowship period	200 Gr / 100 Lt Suya / 200 Gr / 100 Lt Water	2 - 3 kg / da / 2 - 3 kg / da

▲ UYARILAR / WARNINGS

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. / Read the label before use.
- Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. / Use protective gloves and mask.
- Asla uygun doz miktarını aşmayınız, sadece gerekli yerlerde kullanınız. / Never exceed the appropriate dose, use only where necessary.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. / Keep away from children and food.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. / Avoid contact with skin and eyes, and in case of contact, wash with plenty of water.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. / It is recommended to use fertilizer by making soil and/or leaf analysis.

▲ FİRMA BEYANI / COMPANY DECLARATION

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımın dolayısı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır. / The manufacturer guarantees the quality of the product when used in accordance with its recommendations. However, negativities that may arise due to incorrect use and mixing are out of the warranty of the company. Problems that may arise from incorrect use and storage conditions are the responsibility of the user.

▲ DEPOLAMA ŞARTLARI / STORAGE CONDITIONS

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. / Store in its original packaging under normal conditions (cool and dry places). Do not expose the product to direct sunlight. It maintains its physical and chemical properties for at least 3 years under normal conditions. Storage temperature is between +5/+35 °C.





TARBIM
for plant health

www.tarbim.com.tr

2022

PRODUCT CATALOGUE



Online
katalog



TARBİM
for plant health